

Para: Padres y tutores de los estudiantes de 8^{vo} y 12^{do} grado (Spanish Varicella Letter)
De: División de Vacunaciones de Colorado
Asunto: Se requiere una doble dosis de vacuna contra la varicela para asistir a clase
Fecha: 14 de abril de 2015

Mediante la presente carta le informamos acerca del requisito de vacunarse contra la varicela que tienen los estudiantes de 8^{vo} a 12^{do} grado para el año escolar 2015-16. El plan de vacunación obligatorio para las escuelas de Colorado sigue las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Vacunación (ACIP, por su sigla en inglés) y todos los estudiantes, desde el kindergarten hasta el 12^{do} grado deberán demostrar que se han vacunado dos veces contra la varicela al comienzo del nuevo año escolar.

También se puede demostrar que se ha tenido varicela de las siguientes formas:

- Documentación del proveedor de atención médica que deje constancia de que el estudiante ha tenido varicela
- Un análisis que dé positivo de que se ha tenido varicela realizado por un enfermero o médico

Si tiene alguna objeción a que su hijo reciba la vacuna, deberá firmar un formulario de exoneración por motivos personales o religiosos. Si su hijo no puede recibir la vacuna por cuestiones médicas, el proveedor de atención médica puede firmar la exoneración.

Información sobre la importancia de la eficacia de una doble dosis de vacuna contra la varicela:

«Antes de que se dispusiera de la vacuna contra la varicela, había unos 4 millones de casos de varicela al año en los Estados Unidos. Si bien por lo general se trata de una enfermedad leve en niños sanos, se estima que entre 150.000 y 200.000 personas sufren complicaciones, cerca de 11.000 personas tienen que ingresar al hospital y unas 100 personas mueren al año de varicela. **La varicela tiende a ser más grave en adolescentes y adultos que en niños jóvenes.** Las complicaciones más comunes como resultado de la varicela son la sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas, neumonía, compromiso del sistema nervioso central y trombocitopenia.

Se estima que las personas que solo reciben una dosis de vacuna contra la varicela están inmunizadas en un 80 y un 85 % contra la enfermedad. Se adoptó el criterio de administrar doble dosis en 2006 para reducir aun más el riesgo de padecer la enfermedad en el 15 o 20 % de las personas vacunadas que no están del todo inmunizadas y que podrían contraer varicela en la vida adulta, cuando puede resultar más peligrosa.»

Immunization Action Coalition, "Ask the Experts"

Muchas gracias
División de Vacunaciones de Colorado
303-692-2700